

[Varianti pareizai trušu vakcinācijai](#)

1. **MYXOREN** (miksomatozes vakcīna)

Vienreizējas vakcinācijas gadījumā vakcināciju ar monovalentu vakcīnu pret **miksomatozi (Myxoren)** var uzsākt **10 nedēļu vecumā**, imunitāte ilgst vismaz 6 mēnešus. Ja dzīvnieks tiek imunizēts **agrāk nekā 10 nedēļu vecumā, pēc 6 nedēļām jāveic revakcinācija** un tad imunitāte ilgst vismaz 6 mēnešus. Nākamā revakcinācija jāveic ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc pēdējās vakcinācijas.

Vaislas trušiem reģionos ar nelabvēlīgu epizootoloģisko stāvokli vakcinācija jāveic divreiz gadā - pavasarī un revakcinācija vasaras laikā.

Imunitātes ilgums ir ierobežots un atkarīgs no vakcinēto trušu vecuma. No mātes iegūtās antivielas kavē vakcīnas iedarbību, tādēļ **nevakcinēt dzīvniekus jaunākus par 4 nedēļām.**

2. **MYXOREN** (miksomatozes vakcīna) & **PESTORIN MORMYX** (miksomatoze + hemorāģiskā septicēmija vakcīna)

Ieteicama sekojoša imunizācijas shēma: truši jāvakcinē 10 nedēļu vecumā. Nelabvēlīgu infekciozu apstākļu gadījumā vakcināciju var uzsākt agrāk:

a) vakcināciju ar monovalentu vakcīnu pret **miksomatozi (Myxoren)** var uzsākt **4 nedēļu vecumā** un turpināt **revakcināciju ar vakcīnu Pectorin Mormyx**, ko ievada **ne agrāk kā 10 nedēļu vecumā**. Starp vakcīnu Myxoren un Pectorin Mormyx ievadišanu jāievēro 2 nedēļu intervālu.

b) vakcināciju ar vakcīnu **Pectorin Mormyx var uzsākt 6 nedēļu vecumā** un **pēc 4 nedēļām ievadīt otro devu.**

Vaislas dzīvniekus turpmāk revakcinē ar Pectorin Mormyx ik pēc 6 mēnešiem. Ņemot vērā slimības sezonālo raksturu, dzīvnieki jāvakcinē (jārevakcinē) savlaicīgi, lai nodrošinātu to pilnu imunitāti infekcijas uzliesmojuma kritiskajā periodā.